

Henkel H, Schmitz M, Berghofer G, Lang A, Kager A, Steiner E, Schmidl F, Rudas S. (2000). Soziale Vulnerabilität und soziale Isolation bei chronisch psychisch Kranken. *Wiener Medizinische Wochenschrift*; 22: 449-453.

### **Abstract**

Soziale Vulnerabilität und soziale Isolation sollen unter Berücksichtigung des Schweregrades der chronischen Erkrankung psychiatrischer Patienten erfaßt werden. Mit Hilfe eines Index, der die soziale Vulnerabilität beschreibt, bestehend aus Zivilstand, Einkommen, Gesundheit, Wonstatus, Arbeit und Kindheits-Risikofaktoren, wurden 64 schwer chronisch kranke und 84 chronisch kranke Patienten in wenig und sehr vulnerable Personen eingeteilt und miteinander verglichen. Die soziale Isolation wurde zusätzlich nach subjektiven (sich isoliert fühlen) und objektiven Kriterien (allein lebend, keine Freunde, wenig Kontakt zu Eltern und Verwandten) definiert und erhoben. Psychisch schwer Kranke weisen eine hohe bzw. eine signifikant höhere soziale Vulnerabilität und soziale Isolation auf als psychisch leicht Erkrankte. In beiden Gruppen geben sozial isolierte Patienten mehr Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich an als nicht isolierte. Kein Zusammenhang wurde zwischen dem tatsächlichen 'Isolationsgefühl' der Patienten und der Isolation nach objektiven Isolationskriterien gefunden.

Schlüsselwörter: SOZIALE VULNERABILITÄT; SOZIALE ISOLATION; PSYCHISCH KRANK.

## **Social Vulnerability, Social Isolation in Chronically Ill Psychiatric Patients.**

Henkel, H., Schmitz, M., Berghofer, G., Lang, A., Kager, A., Steiner, E., Schmidl, F., Rudas, S.

### **Abstract**

Social vulnerability and social isolation as to different, light and severe grades of chronically ill psychiatric patients were evaluated. A social vulnerability index, composed out of marital status, income, health, living conditions, occupation, and risk factors in childhood was used. The vulnerability of 64 severely chronically ill patients and of 84 chronically ill patients was assessed. According to their vulnerability, the patients were divided into a group of highly vulnerable and a group of less vulnerable patients. The social isolation of the two groups (severley chronically and chronically ill patients) was compared and assessed. We used objective criteria (such as living alone, no friends, no contact to family members) and subjective criteria (feeling isolated). Social Vulnerability and social isolation are higher in

severely chronically ill patients compared to chronically ill patients. The severely sick group is significantly more affected by objective and/or by subjective isolation than the less sick group. In both groups patients have more difficulties in social relationships than non-isolated patients. There is no significant correlation between objective isolation and subjective isolation.

Key Words: SOCIAL VULNERABILITY; SOCIAL ISOLATION; MENTALLY ILL: